

חוסר שטח בדיבור

מידע להורים לילדיים בגיל הורן

אם הילד חזר על צלילים,
הברות או מילים,
נתקע לפעמים ומתקשה
להמשיך לדבר
ואתך מתלבט מה לעשות
-אמכ"י כאן בכדי לסייע.



אמכ"י - "ארגון מגמגים בישראל" (ע"ר) היא עמותה ללא מטרות רווח,
אשר הוקמה במטרה לסייע לילדים ומכוראים מגמגים ולמשפחותיהם.
אחת ממטרותיה המרכזיות של אמכ"י היא מניעת התפתחות גמגום
בקרכב ילדים צעירים אשר מראים סימנים מוקדמים לכך. לשם כך,
מציאה אמכ"י חוברת הדרכה זו. בחוברת מידע אשר יעזר לכם, הורים, לזהות אם
מדובר בغمגום ולהתמודד עם הבעיה באופן מיטבי. באתר אמכ"י, www.ambi.org.il
תוכלו למצוא מידע נוסף על גמגום, דרכי ההתמודדות עם ההפרעה ואפשרויות הטיפול
הקיימות. המידע באתר מיועד לאנשים מגמגים, הורים, גננות, מורים ואנשי מקצוע.



C- 20%



מכלל הילדים בגיל הרך עוברים תקופה של חוסר שטף המעורר תהיות או דאגה אצל הוריהם. בקרוב % 5 מכלל הילדים הgambarום נמשך 6 חודשים ויותר. ברוב המקרים (כ-4/3) תקופה זו חולפת והgambarום נעלם, מלבד 1%. בקבוצה זו הgambarום נשאר והופך לכעיה חרונית. כוון לא קיימת עדין אפשרות לנכא מី יהו אותם ילדים. פעמים רבות, כאשר הורים פונים לחפא הילדים או לגנטה בנושא חוסר השטף של ילדם, נאמר להם שהgambarום בגיל הרך הוא עניין נפוץ וחולף, וכי עליהם להמתין בסבלנות עד

שהתקופה תעבור. אין זה כך. הגיל הרך הוא חלון הזדמנויות לטיפול מוצלח בדרך כלל, וכל יחסית, בgambarום. ככל שהזמן חולף כך קשה יותר לטפל בgambarום ולמנוע את התפתחותו להפרעה חרונית. יש ילדים מגamarומים שאינם מודעים לgambarום, ויש המודעים למgambarום אבל אינם חשים חסוך בשל כך. יש גם ילדים המגאים קשה לgambarום. ילדים כאלה יתאמצו להימנע מהgambarום, למשל, על ידי דחיפה חזקה יותר של הדיבור החוצה, מצמצץ בעיניהם, דיבור בזורה שונה וצדומה. ככל שהילד יתאמץ להימנע מהgambarום, או שיימנע ממצבי דיבור בغالל הפחד לgambarום -gambarום יתחמי.

במרקמים ובטים גם בסביבתו של הילד (הורם, משפחה, חברים, הגנתה), מגבים לgambarום באופן שגורם לידי להתאמץ כדי להימנע מהgambarום.

תגובהו של הילד לgambarום ותגובה הסביבה לgambarום שלו, מכנים את הילד למצב של סחרור, שתוצאותיו עלולה להיות החמורה של gambarום.

טיפול בזמן יכול למנוע את כדור השLEG. בנוסף, גם אם gambarום יפסיק מעצמו, הרי שההשלמה או המתנה ללא טיפול, מותירה את הילד בלבד עם חרודתו, ואת המשפחה במצב של חוסר וודאות.

לעתים די בפגישה אחת או שתיים עם קליני תקשורת, על מנת להקל על הילד ועל המשפחה ולאפשר להם התמודדות טוגה בתקופה זו.

מהו גמגום?

התפתחותיים וסכיבתיים. לgemäßום לעיתים מרכיב תורשתי: לכ- 60% מהילדים המגמגמים, יש קרוב משפחה אשר מגמגם.

חשוב לציין שגם איננו הפרעה רגשית, והוא אין נגרם עקב בעיות פסיכולוגיות. ילד אינו מתחיל למגם מפני שהוא בישן, חרד או לחוץ אלא להיפך: הגמגום הוא זה שיוצר אצלם מכוכחה ולחיצים. בנוסף, מחקרים מוכיחים שאין קשר בין גמגום לבין אינטלקנציה, ואין הבדל בין רמת האינטלקנציה של ילדים או מבוגרים מגמגמים, לבין אלה שאינם מגמגמים. בנוסף, ידוע בוודאות שגם איטם נגרם באשםת הילד או באשמה הורית.

סוגי גמגום

גם יסיל להתבטה במספר צורות מאפיין הגמגום משתנים מילד לילד:
צורה: חזזה על מילים, על הבחנה או על צללים. לדוגמה: "כעַי כעַי כעַי כעַי"
חוֹתְמָאָק גַּעֲלָה"; "כֶּקֶק כֶּקֶק"
גַּזְקָט חַוְגָת". הארכט צלילים: לדוגמה ".:מִילְאָה eeeeeeeeeeeee"

חסימות הילד נראת כמנסה להגד זכר אך הוא איט מצליח להפיק צילול "AMILAT PEKK": הוספה של מילים או של הבחנה, בתקיחת הגבואה בהונאה מהנורמה. למשל "כֶּקֶק אֵם חַוְגָת גַּעֲלָה כֶּקֶק".

גם הוא הפרעה תקשורתית הפוגעת ביכולת לדבר באופן פשוט. הגמגום מופיע לחוב בגיל שנתיים עד 4 שנים, אך יכול להופיע גם מאוחר יותר. כאשר הגמגום נמשך לפחות 3 שנים, קיים סיכון נמוך שהוא יחולף. לפיקן, הסיכון לכך שילד בגיל בית הספר יפסיק למגם, נמוך. התוצאות ומידת הקושי של הגמגום יכולים להשנותו באופן קיזומי בהתאם למצב בו הילד נמצא. למשל, יתרך מצב בו הילד לא יגמגם, או שיגמגם מעט, כאשר הוא מדבר עם חברו הטוב, אך כאשר הוא מתבקש לדבר בכניסה, הוא יגמגם. גם מוטה להשנותו גם על ציר הזמן, ללא כל סיבה נראית לעין. ילד המגמגם יכולה להיות "תקופה קלה" במהלך החיים יגמגם מעט, ו"תקופה קשה" בה יגמג יתירה. תקופות כאלה יכולות להמשך שבועות או חודשים. מספר הבנים עם גמגום שנשאר עולה על מספר הבנות ביחס של 1:4 לערך.

סיבות לגמגום


על אף שהסיבה לגמגום עדין אינה ידועה, קיימת הסכמה בין חוקרים בתחום כי, ככל הנראה, מזוכר במכלול של גורמים לתופעה - אוסף משתנה של גורמים נירוח-פיזיולוגיים, גנטיים,

תופעות נלוות לגמר

של תהיליך רכישת השפה ובעיצומה של התפתחות נרחבת, צפויות להימצא יותר חזות על מילים, על הבורות והארכות של ציללים. עם זאת, במקרים בהם הילד מראה אחד או יותר מהאפיונים הבאים, רצוי לפנות לאבחן אצל קלינאי תקשורת:

תדריות גבואה של חוסר שטף (חו索 שטף יותר מפעם אחת בכל 10 משפטים). מספר חזות גבואה (למשל, חזזה של 3 פעמים ויותר על אותה הבראה). הילד נתקע בili יכולת להוציא צליל מהפה. תופעות הנלוות לחוסר השטף בדיבור, כגון מצומץ בעיניים,

פעמים ובות מחלות למגgeom הראשון התנהגוויות נוספת, שמקוון במאז שעשה הילד כדי לא למגgeom או כדי "להוציא את המילים החוצה": מתח בצוואר, בשפטים וכולסת, תנועות שונות בגוף כגון: מצומץ, Tipoff, רקיעה ברגליים, תזוזות ראש, הימנעות מקשר עין, הימנעות שימוש במילים מסוימות. הימנעות מדיבור.



תזוזות של ידיים, רגליים או ראש. הילד נראה מתוסכל כשהוא מדבר. הילד מנע ממצבי דיבור או מראה פחד שקשרו בדיבור. אם אחד או יותר מהסימנים הללו קיימים, אם איןכם בטוחים או שאתם מודאגים, כדאי לפנות לקלינאי תקשורת. לעיתים די בשיחה טלפוןית או מספר פגישות כדי לשפר את הרגשותכם ואת מצב הילד.

מתי להפנות את הילד לאבחן אצל קלינאית תקשורת?

לא כל חוסר שטף בדיבור הוא בהכרח גמgeom. ילדים ומבוגרים אחד אינם מדברים באופן שוטף כל הזמן. יש עצירות, היסוס, חזזה על מילים והברות. בקרב ילדים המצוים בעיצומו

כיצד תעזוזו לילדכם?

- דברו עם הילד בצורה רגועה ואיטית
אבל הקפידו שהדיבור לא יישמע
מלאכתי או "חוכטוי".

- שדו ליד, באמצעות
شمירה על קשר עין ומחוות
גוף אחרות, שאתם מקשיבים
לו, שחשוג לכם לשמע את
מה שיש לו להגיד ושיש לכם זמן
סכנות לחכות עד שישים לדבנה.



- השתדלו לא להתפרק לדבריו של הילד ולא להפריע לו כאשר הוא מדבר ילד מגมงם קשה יותר לשומר על שטף הדיבור כאשר מתפרקים לדבריו, או כאשר הוא עצמו מתפרק לדברי אחרים. נסו ליצור במשפחה אווירה של סכליות, בה כל אחד מדבר בוחן. אם הילד פונה לאחד מהם כאשר אתם עסוקים, עצרו אותו והגידו לו, למשל: "אני מאד רצחה לך להקשיב לך אבל עכשו אני עסוק/ה. עוד מעט אתפנה ותוכל להגיד לי מה שרצית לומר".

• הקייגו מtocן קגרו של הימן אמי אמי גראן בה הווא נאגה.

- אל תיעצטו ליד לעצור, לקחת אוויר, להאט את קצב הדיבור וכדומה. עצות אלה אינן עוזרות והן עלולות לגרום לידי חוסת תסכול רב יותר וווגשות אשמה על שהוא אין מצליח לעשות את "הזיכרון הנכון".

- אל תשלימו לידי מילים או משפטים כאשר הוא נתקע. תנו לו את הזמן. אם הילד תקעו זמן רב ואני מצליח להתקדם בדיבור, או שהוא נראה במצבה, שאלו אותו אם הוא מוכן לשתף פעולה.

- אם הילד מודע למוגום, דברו אותו על כך. אחרי אישור של גמגם אפשר להגיד לו שהרבה ילדים נתקעים לפעמים כשהם מדברים, וזה בסדר. אתם יכולים לספר יליד שאם לכם הדיבור נתקע כשהייתם קטנים, ואחר כך זה עבר. אפשר להסביר יליד שככה זה כשלמודים דברים חדשים. בהתחלה זה קשה, אבל בסוף מצלחים. הורים יכולים לחוששים שאם ידברו עם הילד על גמגם, המצב ייחרף, ביום ידוע שהדבר אכן כן.

הנproc הוא. חשוב לא להפוך את הגמגום לנושא שלא מדברים עליו. כפי שאינם מתעלמים מקשימים או מצוקות אחרות של הילד, כך אין סיבה להתעלם מגמגום אליו הילד מודע. התעלמות מהגמגום שסדרת ליד שגמגום הוא אולי משאנו שעליו להתבונש בו, ומשarieה אותו בלבד עם הקושי.

- הימנעו מלבקש מהילד לדבר מול אנשים אחרים. למשל, "ספר לסבתא מה עשית היום". ילדים מגמגמים כל יותר לדבר באופן חופשי, ולא לפי בקשה.
- נסו להפחית את כמות השאלות שאותם שואלים את הילד. במקרים לשאול, אפשר להגיב למה שהילד אמר, או לספר משהו על עצמו ולחקות שהילד ידבר ביוזמתו. למשל, במקרה לשאול את הילד איך היה בgan, אפשר להגיד לו: "אתה יודע, היום היה לי יום ממש טוב בעבודה", ולראות אם הילד בוחר לספר דבר מה על היום שלו בגן.

• נסו להוריד באופן כללי את לחץ הזמן בבית. לדוגמה, זמן ההתארגנות בוקר לחוץ כמעט בכל בית. אפשר לקום חצי שעה מוקדם יותר, אז לא יהיה צורך להרח ולhattuckן. האווירה תהיה הגועה יותר, וכך יהיה גם תהיה אווירה תומכת שטף דיבוכו.

• נסו לפנות מדי יום או כמה פעמים בשבועו, מסpter דקות שיהיו זמן איקוט שלכם ושל ילדכם. בזמן זה הקפידו שמלא תשומת הלב שלכם (ללא טלפונים, ילדים (אחים וגד). תנו הילד לבחור פעילות משותפת.





בזמן הפעילות הקפidea על דבר בקצב אישי ורגוע.
לזמן איקוטה זהה תהי השפעה חיונית על הביטחון
העצמי של הילד ועל תחושת הקירבה ביניכם.

• אם אתם חשיטים דאגה בנוגע לשטף דברו של ילדכם, פנו לקלינאי

תקשורת אל תחכו לראות אם הגמגום יחלף מאליו. טיפול מוקדם יותר ישיע להתחממות טוביה יותר

טיפול בגמגום ילדים בגל הרך

המטרה בטיפול בגמגום בקרב ילדים בגל הרך היא למנוע מהבעיה להתרחב לכדי הפרעה כרונית, ככלומר, להשיג בסופו של דבר דבר שוטף מיל הרך הגמגום עדין אותו מושרש אצל הילד, והסיכון לטפל בו בהצלחה גבוהה. ישן מספר גישות לטיפול בגל זה. השיטה הרוחות היא טיפול עקיף בטיפול עקיף קליני והקשורת עודכ בזמן להווים, ולמעשה, דרכם.

הטיפול כולל:

ההעברה מידע להורים בנושא גמגום: ככל שההורים יכינו טוב יותר את ההפרעה ואת הגורמים המשפיעים עליה, כך הם יכולים לעזור לילדים באופן מיטבי. הדרכת ההורים: ה dredrica נועדה ליצור עבור הילד סכיפה תומכת שטף סכיפה תומכת שטף נצרת נצרת כאשר נערכים לשוניים תקשורתיים, שינויים בהתנהגות, שינויים בסדר היום של המשפחה ושינויים באווירה בבית.

אם אתה מוגמגם אתה לא לבד!

עמותת אמבי"י נמצאת פה בשביילך

אמבי"י (ארגון מוגמגים בישראל) היא ארגון העוזר לאנשים מוגמגים ולבני משפחותיהם. אם אתה או יליך מוגמגם, אתה מזמין לפנות אלינו ונשמח לעזור לך.



www.ambi.org.il
אמבי"י – ארגון מוגממים בישראל. אותה אמבי"י – דוא"ל: info@ambi.org.il – טלפון: 02-6491907

כתובת: אמבי"י, תד. 83352 מבשת ציון מיקוד 90805 – מס' עמותה: 58-034-034-7 – טלפון: 02-6491907